

**“HACIA UN NUEVO
ESQUEMA BÁSICO DE
VACUNACIÓN”**

2007

Nuevo Esquem a 2007

13 inmunógenos
199
dólares

VACUNA	ENFERMEDAD QUE PREVIENE	DOSIS	EDAD	FECHA DE VACUNACIÓN
BCG	TUBERCULOSIS	ÚNICA	Al nacer	
ANTIHEPATITIS B	HEPATITIS B	PRIMERA	Al nacer	
		SEGUNDA	2 meses	
		TERCERA	6 meses	
PENTAVALENTE ACELULAR (DPaT+VIP+Hib)	DIFTERIA, TOS FERINA, TÉTANOS, POLIOMIELITIS E INFECCIONES POR HAEMOPHILUS INFLUENZAE TIPO b	PRIMERA	2 meses	
		SEGUNDA	4 meses	
		TERCERA	6 meses	
		CUARTA	18 meses	
DPT	DIFTERIA TOS FERINA TÉTANOS	REFUERZO	4 años	
ROTAVIRUS	GASTROENTERITIS CAUSADA POR ROTAVIRUS	PRIMERA	2 meses	
		SEGUNDA	4 meses	
NEUMOCÓCCICA CONJUGADA 7 valente	INFECCIONES POR NEUMOCOCO	PRIMERA	2 meses	
		SEGUNDA	4 meses	
		TERCERA	1 año	
ANTIINFLUENZA	INFLUENZA	PRIMERA	De los 6 meses a los 35 meses (en octubre y noviembre)	
		SEGUNDA	Al mes de la primera	
		REVACUNACIÓN ANUAL	A partir de los 35 meses (en octubre y noviembre)	
TRIPLE VIRAL SRP	SARAMPIÓN, RUBÉOLA Y PAROTIDITIS	PRIMERA	1 año	
		SEGUNDA	6 años	
Td	TÉTANOS Y DIFTERIA	REFUERZO	A partir de los 12 años	
SABIN	POLIOMIELITIS	ADICIONALES		
SR	SARAMPIÓN - RUBÉOLA	ADICIONALES		
ANTIHEPATITIS B (Para los no vacunados previamente)	HEPATITIS B	PRIMERA	A partir de los 12 años	
		SEGUNDA	A los 4 meses de la primera	
OTRAS VACUNAS				

Campañas de vacunación planificadas para la eliminación de la rubéola y del SRC por país en el 2006

